

Det är inte svaga människor som
tar Antabus® ...


Det är de starka!



Du har gjort ett gott val

Du har valt att låta dig behandlas med Antabus® och det kan bli ett av ditt livs bästa beslut. Det kan få stor betydelse både för dig själv och din familj, dina vänner och arbetskamrater.

Antabus® kan nämligen hjälpa dig att få ett klokare förhållande till alkohol. Metoden är enkel: När du tar Antabus® tål du inte alkohol i någon form alls. Om du ändå provar att dricka alkohol under Antabusbehandling kommer det att få allvarliga konsekvenser.



OBS!

Förvara alltid Antabus® på ett ställe där ingen kan riskera att ta tabletterna av misstag!

Hur verkar behandlingen?

Alkohol bryts ned i kroppen innan den utsöndras. Antabus® blockerar ett steg i den nedbrytningen genom att hämma ett enzym. När man dricker alkohol får enzymhämmningen till följd att acetaldehyd ansamlas i kroppen.

Acetaldehyden ger en rad obehagliga symtom som huvudvärk, kraftig rodnad, tryck över bröstet, andfåddhet, hjärtklappning, illamående och i värsta fall allvarligt chocktillstånd. Reaktionen kommer 5-15 minuter efter att man har druckit alkohol.



Några vanliga frågor om Antabus®

Hur länge ska jag behandlas?

Behandlingstiden varierar från fall till fall. Du bör behandlas så länge att du inte längre behöver det stöd Antabus® ger för att avstå från alkohol.

Hur lång tid efter det att man slutat med Antabus® kan man få en reaktion om man dricker alkohol?

Man kan få en alkohol-Antabus reaktion upp till 2 veckor efter att man slutat med Antabus®.

Kan man äta mat med vin i, som t ex kycklinggryta med vitt vin, när man tar Antabus®?

Det beror på hur länge rätten kokat sedan vinet tillsatts. Om den har kokat upp ordentligt har alkoholen hunnit avdunsta.

Likör- och punschpraliner då?

Likör- och punschpraliner och t ex efterrätter smaksatta med alkohol skall man undvika. Det gäller också de flytande läkemedel som innehåller alkohol.

Vilka biverkningar kan man få av Antabus®?

De vanligaste biverkningarna är trötthet, magbesvär och dålig andedräkt. Klåda och hudutslag förekommer också, då skall man sluta med Antabus®. Störningarna i leverfunktion och neurologiska besvär förekommer sällan och oftast efter en längre tids behandling. Man brukar kontrollera leverfunktionen under behandlingen.

Kan man ge blod när man tar Antabus®?

Nej, man skall inte vara blodgivare under behandlingstiden.

Det finns många som skulle kunna ha lika stor eller större glädje av Antabus® som du. De har bara inte haft styrkan och viljan att ta beslutet.

-Det har du!



Håll fast vid ditt beslut. Och vid din behandling. Kom ihåg varför du började. Och var glad över att du har kommit igång.

Lycka till med ditt beslut att ta Antabus®!



Actavis AB Nordenflychtsvägen 74, 112 89 Stockholm
Tel 08-13 63 70 Fax 08-656 96 90 E-post info@actavis.se
www.actavis.se