

# *Din behandling med Docetaxel Actavis*



En informationsbroschyr  
för patienter och anhöriga.

  
creating value in pharmaceuticals

Broschyren du håller i din hand vänder sig till dig som ordinerats Docetaxel, antingen som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel. Målet med broschyren är att du ska känna dig trygg med din behandling och få en ökad förståelse för hur Docetaxel fungerar. Här förklaras de vanligaste biverkningarna och hur dessa kan mildras, alternativt behandlas.

Har du frågor om din behandling som denna broschyr inte besvarar ska du alltid kontakta din läkare eller sjuksköterska. Det finns också mycket information att hämta hos patientorganisationer och via cancerfonden:  
[www.cancerfonden.se](http://www.cancerfonden.se)

## *Docetaxel Actavis mot cancer*

Cancer berör många människor på något sätt. Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar, och man räknar med att var tredje svensk kommer att drabbas av cancer under sin livstid. Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa celltyper delar sig okontrollerat.

Docetaxel är ett cytostatika som har visat sig vara effektivt mot den typ av cancer du har. I folkmun kallas ofta cytostatika för "cellgift", vilket är olyckligt eftersom det har en obehaglig klang. Det är cancercellerna man vill angripa. De delar sig oftast snabbare än de friska cellerna i kroppen, med vissa undantag. Därför är cytostatika speciellt effektivt mot just cancerceller.

Docetaxel används vid behandling av bröstcancer, lungcancer, prostatacancer, magsäckscancer och huvud-halscancer och

det är en substans som har sitt ursprung i barren från idegranen. Docetaxel tillhör gruppen taxoider.



## Så här ges Docetaxel Actavis



Docetaxel ges vid besök på sjukhus. En sjuksköterska ger läkemedlet som en intravenös infusion (dropp) direkt i ett blodkärl på cytostatikamottagningen. Docetaxel ges som infusion, vanligtvis under en timme var tredje vecka. Dosen bestäms av din kroppstorlek, dina blodvärden och ditt allmäntillstånd. Innan behandling kommer dina blodvärden och levervärden att kontrolleras. Din läkare ordinerar den dos och det dosintervall som är rätt för dig.

För att få största möjliga effekt, med acceptabla biverkningar, kan man ge flera olika sorters cytostatika samtidigt.

En kur är en kombination av flera cytostatika anpassad för en viss cancersjukdom. Vid behandlingsuppehållen klarar de normala cellerna att återhämta sig och reparera skador

i sin arvsmassa, medan cancercellerna i bästa fall inte har samma reparationsförmåga.

Antalet behandlingsomgångar bestäms i varje enskilt fall, beroende på effekten och hur väl du tolererar behandlingen.

Förebyggande behandling för att minska risken för biverkningar ges i form av kortison. Kortisonet ges vanligen i tablettform dagen

före Docetaxel, samma dag samt dagen efter behandlingen. Kortisonet kan göra att du känner dig rastlös och/eller upprymd. Vissa blir röda i ansiktet och yngre kan få acne-problem. Om man har besvär av kortison kan man diskutera detta med sin läkare och eventuellt ändra doserna inför nästa behandling. Även annan premedicinering kan ordinerars när Docetaxel kombineras med andra läkemedel.

## Försiktighet

Före första infusionen kommer blodprov att tas för att utreda om din leverfunktion är tillräcklig. Innan varje infusion kommer blodprov att tas för att kontrollera att du har tillräckligt många blodkroppar för att behandlas med Docetaxel. Din läkare kan besluta att ändra dosen eller skjuta upp behandlingen beroende på ditt allmäntillstånd eller om dina blodvärden är alltför låga. Blodprov kommer att tas regelbundet.

Män avråds från att skaffa barn under behandlingen och upp till 6 månader efter att

behandlingen med Docetaxel avslutats. Om du önskar skaffa barn under behandlingen eller upp till 6 månader efter att behandlingen avslutats bör du rådgöra med din läkare eller annan sjukvårdspersonal angående nedfrysning av sperma innan behandlingen påbörjas.

Behandling med Docetaxel Actavis ska undvikas under graviditet. Du ska avbryta eventuell amning under behandling med Docetaxel Actavis.

## Biverkningar

Docetaxel kan orsaka biverkningar, liksom alla läkemedel, men det drabbar inte alla. De flesta biverkningar av Docetaxel är behandlingsbara och det är sällan patienter behöver avsluta behandling som följd av biverkningar. Ibland kan dock dosen behöva justeras. Det är mycket viktigt att du informerar din doktor eller sjuksköterska om du under eller mellan behandlingarna upplever några besvär.

De flesta som får Docetaxel får ont i musklerna cirka tre dagar efter behandling, och detta sitter i under cirka tre dagar. Det kan kännas som ordentlig träningsvärk men kan avhjälpas med vanliga smärtstillande läkemedel. Smärtan är inte farlig, men kan i vissa fall vara besvärlig.

Cirka en vecka efter behandlingen minskar de vita blodkropparna och man kan då få

feber. Om den är över 38 grader, eller om man får frossa ska man kontakta sjukhuset.

Många tappar håret, men det återkommer oftast efter avslutad behandling. Vissa kliniker förordar t ex så kallade "kylmössor" för att motverka håravfall. Rådfråga också din behandlande sjuksköterska om peruk.

Så gott som alla patienter känner en viss trötthet en knapp vecka efter behandlingen.

Rodnad och svullnad i handflator och under fotsulor kan leda till att huden fjällar. Nagelkvaliteten försämras efter några behandlingar, vilket kan leda till infektioner och svamp. Hand- och fotvård är därför viktigt.

Svullnad (ödem) kan uppkomma efter några behandlingar och det ska i så fall

meddelas läkaren och/eller behandlande sjuksköterska.

Illamående och diarré.

Din sjuksköterska kommer att ge dig mer utförlig information om eventuella biverkningar och vad man kan göra för att lindra dem.

Docetaxel kan påverka effekten av andra läkemedel. Informera därför alltid läkare, apotekare eller sjuksköterska om du äter mediciner mot andra sjukdomar. Detta gäller även receptfria läkemedel och så kallade naturmedel eller naturläkemedel.

Många upplever att sexlusten försvinner tillfälligt under behandlingen. Cytostatikabehandling kan i vissa fall påverka slemhinnorna och då även slemhinnorna i underlivet.

Läs gärna mer om detta i Cancerfondens broschyr *Sex och cancer*: [www.cancerfonden.se/sv/cancer/Vardagen-forandras/Sex-och-cancer/](http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Vardagen-forandras/Sex-och-cancer/)

.....  
*De biverkningar som listats här är ett urval av de vanligen förekommande. Om du vill ha en fullständig förteckning så sök på [www.fass.se](http://www.fass.se) och Docetaxel Actavis, alternativt läs bipacksedeln som medföljer förpackningen.*  
.....

Actavis är ett av världens ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Företaget grundades 1956 och var fram till 1999 verksamt på den isländska marknaden. Med ett omfattande tillväxtprogram innefattande såväl mer än 20 strategiska uppköp som organisk tillväxt har Actavis Group idag ca 11 000 medarbetare och är etablerat i ungefär 40 länder. I Sverige marknadsför Actavis över 200 produkter inom tre affärsområden: Öppenvård, Slutenvård och Egenvård.

**Actavis AB**

Nordenflychtsvägen 74  
SE-112 89 Stockholm

☎ (+46) 8 13 63 70

☎ (+46) 8 656 96 90

@ info@actavis.se

www www.actavis.se

